

## Cvičenie 2: kvantifikátory

**Úloha 1.** Aký význam budú mať výroky  $(\forall x)a(x)$ ,  $(\exists x)a(x)$  ak sú definované na a) jednoprvkovej b) práznej množine?

**Úloha 2.** Určte, o čom hovoria nasledujúce výroky, určte ich pravdivostnú hodnotu a znegujte ich. (Uvažujeme univerzum  $M = \mathbb{Z}$ , ak nie je napísané ináč.)

- a)  $(\exists x)(x \in \mathbb{N})$
- b)  $(\exists x)(x \in \mathbb{N} \wedge x > 5)$
- c)  $(\forall x)(x^2 > 0)$
- d)  $(\exists x)(x \bmod 2 = 0 \vee x \bmod 2 = 1)$
- e)  $(\forall x)(x \bmod 2 = 0 \vee x \bmod 2 = 1)$
- f)  $(\exists x)(x \bmod 2 = 0 \wedge x \bmod 2 = 1)$
- g)  $(\forall x)(\forall y)[(x > 0 \wedge y > 0) \rightarrow (x \cdot y > 0)]$
- h)  $(\forall a)(\forall b)[(a \in \mathbb{Q} \wedge b \in \mathbb{Q} \wedge a \neq b) \rightarrow (\exists c)(c \in \mathbb{R} - \mathbb{Q} \wedge a < c < b)], \quad \text{univerzum: } M = \mathbb{R}.$
- i)  $(\forall a)(\forall b)[(a \notin \mathbb{Q} \wedge b > 0) \rightarrow (\exists c)(c \in \mathbb{Q} \wedge |a - c| < b)], \quad \text{univerzum: } M = \mathbb{R}.$
- j)  $(\forall a)(\forall b)[(a \in \mathbb{N}^+ \wedge b \in \mathbb{N}^+) \rightarrow (\exists c)(c \neq 0 \wedge a^2 - 2b^2 = c)]$
- k)  $(\forall a)[a \in \mathbb{N}^+ \rightarrow (\exists b)[b \in \mathbb{N} \wedge (\forall c)((c \in \mathbb{N} \wedge c > b) \rightarrow c^a < 2^c)]]$

**Úloha 3.** Výrok s „klasickým“ použitím kvantifikátorov  $(\forall a \in A)(\exists b \in B)p(a, b)$  chceme ekvivalentne prepísať na „formálne“ použitie kvantifikátorov. Môžeme to spraviť takto  $(\forall a)(\exists b)[a \in A \rightarrow (b \in B \wedge p(a, b))]$ ?

**Úloha 4.** Zistite, či nasledovné výroky sú tautológie (ak áno, stačí intuitívne zdôvodnenie):

- a)  $(\forall x)a(x) \rightarrow (\exists x)a(x)$
- b)  $(\exists x)a(x) \rightarrow (\forall x)a(x)$
- c)  $(\forall x)(a(x) \rightarrow b(x)) \rightarrow ((\forall x)a(x) \rightarrow (\forall x)b(x))$
- d)  $((\forall x)a(x) \rightarrow (\forall x)b(x)) \rightarrow (\forall x)(a(x) \rightarrow b(x))$
- e)  $(\exists x)(a(x) \rightarrow b(x)) \rightarrow ((\forall x)a(x) \rightarrow (\exists x)b(x))$
- f)  $((\forall x)a(x) \rightarrow (\exists x)b(x)) \rightarrow (\exists x)(a(x) \rightarrow b(x))$

**Úloha 5.** Zostavte výrokové formy, ktoré budú hovoriť nasledovné:

- a)  $e(a)$ :  $a$  je párné číslo
- b)  $d | a$ : číslo  $a$  je deliteľné číslom  $d$ .
- c)  $p(x)$ :  $x$  je prvočíslo
- d)  $a \bmod d = z$ :  $a$  dáva zvyšok  $z$  po delení číslom  $d$

*Poznámka.* Premenné použité v týchto výrokových formách môžu byť väčšinou brané len z niektorých množín (napr. celé čísla). Tieto zamlčané podmienky si doplňte podľa toho, ako sú známe.

**Úloha 6.** Zapíšte nasledovné výroky (môžete používať výrokové formy z predchádzajúcej úlohy):

- a) Existuje práve jedno párné celé číslo.
- b) Prvočísel je nekonečne veľa.
- c) Pre každé celé čísla  $a, d$  ( $d \neq 0$ ) vieme jednoznačne určiť zvyšok čísla  $a$  po delení číslom  $d$ .