

Cvičenie 4: matematická indukcia

Úlohy na cvičenie

Úloha 1. Dokážte: $(\forall n \in \mathbb{N}^+)(2^n < n! \Rightarrow 2^{n+1} < (n+1)!)$

Úloha 2. Dokážte, že pre všetky prirodzené čísla n platí

$$1 \cdot 2 + 2 \cdot 3 + 3 \cdot 4 + \cdots + n \cdot (n+1) = \frac{n(n+1)(n+2)}{3}.$$

Ďalšie úlohy na dokazovanie súčtov nájdete v <http://www.dcs.fmph.uniba.sk/~rajnik/udds/zbierka.pdf>, str. 10.

Úloha 3. Nájdite všetky prirodzené čísla n , pre ktoré platí

a) $2^n \geq n - 2$, b) $n^2 \leq 2^n$.

Úloha 4. Dokážte, že pre každé celé číslo $n \geq 2$ platí

$$1! + 2! + 3! + \cdots + n! < \frac{(n+1)!}{n-1}.$$

Úloha 5. Na stole máme v rade $n \in \mathbb{N}^+$ mincí v rade zľava doprava, ktoré môžu byť ľubovoľne otočené (bud' lícom nadol, alebo nahor). V jednom ľahu môžeme zobrať niekoľko prvých mincí zľava a každú z nich otočiť. Dokážte, že môžeme naše ľahy voliť tak, aby sme po nejakom čase mali všetky mince otočené lícom nahor.

Úloha 6. Máme štvorčekovú sieť rozmerov $2^n \times 2^n$ štvorčekov pre celé číslo $n \geq 1$. Jedno zo štyroch políčok v strednom štvorci 2×2 je zafarbené na čierne. Dokážte, že každú takúto štvorčekovú sieť vieme vydláždiť dlaždicami v tvare triomina L (ako na obrázku) tak, že sa dlaždice nebudú prekrývať a každé políčko s výnimkou čierneho bude zakryté dlaždicou. Dlaždice vieme aj otáčať. [Riešenie]



Úloha 7. V rovine je rozmiestnených $n \in \mathbb{N}$ kružníc, z ktorých každá pretína všetky ostatné. Dokážte, že oblasti roviny, ktoré tieto kružnice vyčleňujú, možno ofarbiť dvoma farbami tak, aby žiadne dve susedné oblasti nemali rovnakú farbu. Oblasti, ktoré majú spoločné len niektoré body, nepovažujeme za susedné.

Úloha 8. Hanojské veže je hlavolam, ktorý sa skladá z troch tyčí (veží) a $n \in \mathbb{N}^+$ diskov (s dierou uprostred) rôznych veľkostí. Na začiatku sú všetky disky uložené na jednej veži. V jednom ľahu môžeme presunúť najvrchnší disk z jednej veže a položiť ho na vrch druhej veže. Po celý čas musíme dodržať pravidlo, že väčší disk nemôže byť položený na menší disk. Cieľom hlavolamu je presunúť všetky disky z jednej tyče na druhú tyč. Dokážte, že tento hlavolam možno vyriešiť pomocou $2^n - 1$ ľahov.

Ďalšie úlohy na precvičovanie

Úloha 9. Dokážte, že pre každé prirodzené číslo n platí:

- a) $3 | n^3 - n$,
- b) $5 | n^5 - n$,
- c) $31 | 5^{n+1} + 6^{2n-1}$,
- d) $133 | 11^{n+1} + 12^{2n-1}$.

Úloha 10. Nájdite všetky prirodzené čísla n , pre ktoré platí

- a) $n! > 2^n$, c) $3^n + 4^n \geq 5^n$, e) $3^n < n!$,
 b) $2n < 3^n$, d) $2^n \geq 20n$, f) $(2n)! < 2^{2n} \cdot (n!)^2$.

Úloha 11. Dokážte, že políčka tabuľky $2^n \times 2^n$ možno zafarbiť bielou a čierrou farbou tak, že keď si zoberieme ľubovoľné dve riadky, tak sa budú na polovici miest zhodovať a na zvyšnej polovici miest lísiť.

Úloha 12. V bani s neobmedzeným množstvom poschodí, ktoré sú zhora nadol očíslované $-1, -2, -3, \dots$, pracuje niekoľko (konečne veľa) trpaslíkov. Každý deň, v rovnakom čase, z každého poschodia, na ktorom sa nachádzajú aspoň dva trpaslíci, sa práve jeden trpaslík presunie nadol o toľko poschodí, kolko kolegov mal v ten deň na svojom poschode. Dokážte, že po určitom (konečnom) počte dní bude na každom poschode najviac jeden trpaslík.

Úloha 13. Pod *rozlomením* obdlžníkovej tabuľky čokolády rozumieme jej rozdelenie (pozdĺž priamky, ktorá prechádza hranami medzi štvorčekmi) na dve obdlžníkové tabuľky, ktoré dohromady obsahujú rovnaký počet štvorčekov ako pôvodná tabuľka. Dokážte, že každú obdlžníkovú tabuľku s $n \in \mathbb{N}^+$ políčkami možno rozdeliť na jednotlivé štvorčeky pomocou $n - 1$ rozlomení. Ako by sa zmenilo riešenie úlohy ak by bola zadaná pre tabuľku $a \times b$ políčok, kde $a, b \in \mathbb{N}^+$.

Náročnejšie úlohy

Úloha 14. Nech $F_0 = 0, F_1 = 1, F_2 = 1, F_3 = 2, \dots$ sú fibonacciho čísla. Dokážte, že pre ľubovoľné $n \geq 1$ platí:

$$\sum_{k=0}^n F_k = F_{n+2} - F_1$$

Úloha 15. Nech a_1, a_2, \dots, a_n je n kladných reálnych čísel. Dokážte, že

$$\sum_{i=1}^n a_i \leq n - 1 + \prod_{i=1}^n \max(1, a_i),$$

teda

$$a_1 + a_2 + \dots + a_n \leq n - 1 + \max(1, a_1) \max(1, a_2) \dots \max(1, a_n).$$

Úloha 16. Dokážte, že pre ľubovoľných n kladných reálnych čísel x_1, x_2, \dots, x_n so súčinom 1 platí

$$x_1 + x_2 + \dots + x_n \geq n.$$

Úloha 17. Dokážte, že pre ľubovoľných n kladných reálnych čísel x_1, x_2, \dots, x_n platí nerovnosť

$$\frac{x_1}{x_2} + \frac{x_2}{x_3} + \dots + \frac{x_{n-1}}{x_n} + \frac{x_n}{x_1} \geq n.$$

Úloha 18. Dokážte, že pre každé prvočíslo p a každé prirodzené číslo n platí $p \mid n^p - n$.

Úloha 19. Turnaja sa zúčastnilo n tímov. Každá (neuspriadaná) dvojica tímov odohrala práve jeden zápas. Každý zápas sa skončil výhrou niektorého tímu. Dokáže, že tímy možno zoradiť do postupnosti t_1, t_2, \dots, t_n tak, že tím t_1 vyhral nad tímom t_2 , tím t_2 nad t_3 a tak ďalej až tím t_{n-1} vyhral nad tímom t_n .

Úloha 20. Nech x je reálne číslo a $x + \frac{1}{x}$ je celé číslo. Dokážte, že potom aj $x^n + x^{-n}$ je celé číslo pre všetky prirodzené čísla n .

Riešenie úlohy 5

Tvrdenie dokážeme matematickou indukciou.

Pre $n = 1$: ak je jediná minca otočená lícom nahor, skončili sme, inak ju vieme otočiť.

Nech $n \in \mathbb{N}^+$:

Indukčný predpoklad (IP): Ak máme v rade n mincí, tak ich vieme danými ľahmi otočiť všetky lícom nahor.
Dokážeme, že ak máme v rade $n + 1$ mincí, tak ich vieme tiež danými ľahmi otočiť:

1. Ak je posledná minca lícom nadol, tak otočíme všetky mince (prvých $n + 1$ zľava).
2. Teraz máme poslednú mincu otočenú lícom nahor. Podľa indukčného predpokladu vieme aj prvých n mincí otočiť lícom nahor – ignorovanie poslednej mince nám úseky mincí zľava nemení.

Takže vieme aj rad $n + 1$ mincí otočiť lícom nahor. Dôkaz indukciou je tak hotový.